

## **KUALITAS Nutrisi *CALLIANDRA CALLOTIRSUS* AND *GLIRICIDIA SEPIUM* PADA BAGIAN MORFOLOGI TANAMAN YANG BERBEDA**

Dewi Ratih Ayu Daning  
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang  
daning\_nutritionist@yahoo.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecernaan bahan kering dan bahan organik bagian tanaman berbeda dari Kaliandra dan Gamal yang diuji secara *in vitro*. Peubah yang diamati meliputi data produksi segar pada bagian tanaman kaliandra dan gamal, diameter dan panjang ranting tanaman kaliandra, analisis proksimat, Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Bahan Organik (KcBO). Data yang diperoleh dilakukan pengujian independent sample *t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data produksi daun, batang, dan kulit batang kayu pada tanaman Kaliandra dan Gamal tidak ada perbedaan yang nyata ( $P>0,05$ ), akan tetapi panjang batang dan diameter batang antara Gamal berbeda nyata ( $P>0,05$ ) dibandingkan Kaliandra, selanjutnya untuk mengetahui kualitas nutrisi dan kecernaan bagian tanaman dilakukan pengujian di Laboratorium Biokimia Nutrisi, Fakultas Peternakan, UGM. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas nutrisi bagian daun dan kulit batang tanaman kaliandra dan gamal juga tidak ada perbedaan, akan tetapi nilai kecernaan bahan kering dan bahan organik bagian kulit kayu lebih tinggi dibandingkan bagian daun. Selanjutnya dari hasil produksi tanaman dapat disimpulkan bahwa kedua tanaman tersebut tidak berbeda nyata untuk produksinya, akan tetapi diameter batang lebih besar tanaman gamal dibandingkan tanaman kaliandra.

**Kata Kunci:** *Morfologi; Calliandra dan Gliricidia; bahan organik; degradasi rumen; metode produksi gas in vitro*

### **PENDAHULUAN**

Tanaman Legum merupakan tanaman yang biasanya digunakan untuk pakan ternak ruminansia dan juga non ruminansia. Legum ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, karena memiliki perakaran yang banyak mengandung air, legume merupakan tanaman pakan yang sangat penting bagi ternak karena kaya kandungan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan ternak. Indonesia merupakan daerah tropis yang memiliki keayaan jenis tanaman pakan yang beragam, salah satunya Kaliandra dan Gamal. *Calliandra* and *Gliricidia* memiliki karakteristik kandungan protein yang tinggi, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pokok nutrisi ternak. Morfologi pada bagian tanaman legume memiliki kandungan nutrisi yang berbeda pada setiap bagiannya,. Pada bagian vegetative tanaman mengandung 70% komponen bahan kering dari total tanaman, sehingga akan berpengaruh juga terhadap kualitas hijauan dari legume (Elevitch and Francis, 2006).

Kaliandra termasuk salah satu tanaman legume yang sangat penting bagi ternak ruminansia pada daerah tropis karena termasuk tanaman yang tumbuh dengan cepat dan baik, meskipun pada kondisi tanah yang buruk. Kaliandra merupakan tanaman yang mempunyai bentuk berupa pohon kecil atau perdu yang termasuk kedalam keluarga leguminosa (Mulyana et al., 2006). Sebagian besar peneliti melaporkan bahwa kaliandra dalam keadaan segar sangat *palatable* untuk ternak, meskipun tidak mengalami masa adaptasi pakan (Karda, 2011). Kalindra juga merupakan sumber protein ternak sebesar 31,35% (Novia et al., 2015), meskipun demikian Tangendjaja et al (1992) melaporkan bahwa kandungan tannin sebesar 1,5-11,3% pada kaliandra menyebabkan tingkat kecernaan rendah sebesar 30-60%. Hasil penelitian Salawu et al (1999) juga menjelaskan bahwa kecernaan protein secara *in vitro* pada bagian daun dan biji kaliandra memiliki perbedaan yang signifikan, hal ini dikarenakan kandungan tannin setiap bagian tanaman kaliandra juga berbeda.

Tanaman legume yang sangat penting bagi ternak selain kaliandra yaitu gamal (*Gliricidia sepium*) karena tanaman yang cepat tumbuh, mampu mengikat nitrogen, sumber kayu bakar, pohon

naungan dan tiang bangunan (Natalia et al., 2009). Produksi gamal yang dilakukan setiap 3 bulan sekali menghasilkan produksi sebanyak 32,50 ton/ha/tahun (Wong, 2012). Berdasarkan Orskov (2000), evaluasi pakan sangat penting bagi peternak dalam hal perencanaan penanaman tanaman pakan, sehingga memberikan informasi untuk menentukan tanaman yang terbaik untuk ternak. Teknik *in vitro* pada laboratorium merupakan teknik untuk menentukan estimasi degradasi pakan mendekati pencernaan dan metabolisme energi untuk ternak ruminansia (Menke et al., 1988). Teknik gas tes banyak diminati oleh peneliti karena dapat diketahui degradasi pakan melalui pengukuran volume setiap waktu untuk satu jenis sample (Orskov 1993). Hasil penelitian Mei et al. (2013) menjelaskan bahwa komposisi rasio produksi gamal berkisar 72-76% bagian daun dan 24-28% bagian ranting, akan tetapi proporsi ini akan mengalami perubahan seiring peningkatan umur gamal. Penurunan proporsi daun dan ranting akan berhubungan dengan peningkatan kandungan dinding sel (Djuned et al., 2005). Menurut Hartadi et al., (1993) kandungan nutrisi gamal 25%, Elevith dan Franchis (2006) 18-24%), Natalia et al (2009) 20-30% dan Mei et al (2013) 24,28%-25,98%. Kandungan nutrient yang sangat tinggi pada gamal sangat cocok untuk suplemen pada hijauan berkualitas rendah, akan tetapi kualitas nutrisi pada gamal memiliki kandungan yang berbeda pada setiap bagian tanamannya (Andrew, 1994). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan nutrisi dan pencernaan kaliandra dan gamal pada bagian tanaman yang berbeda dengan teknik *in vitro* gas tes.

## METODE PENELITIAN

**Persiapan sampel kaliandra dan gamal.** Kaliandra dan gamal merupakan tanaman koleksi dari kebun Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang. Lokasi yang terletak pada altitude 456 m diatas laut, 112 06' lintang selatan, 7,06' lintang timur, Temperatur: 22,7-25,1 max:32,7°C, kelembaban 79-85%, jenis tanah inceptisol, serta rata-rata curah hujan sebesar 1100 mm. Tanaman berumur 5 tahun dan periode pemangkasan setiap 14 minggu/56 hari. Pematangan tanaman dilakukan menggunakan gunting pada bagian tanaman pangkalnya, ranting dengan tinggi potong 100 cm dari tanah dan 717 cm dari percabangan. Hasil pematangan ditimbang dengan berat segar dan selanjutnya dipisahkan antara daun dan batang kemudian ditimbang lagi sebagai data produksi segar. Tanaman dipisahkan antara daun dan kulit batangnya untuk mempersiapkan sampel yang selanjutnya dijemur hingga kondisi kering udara. Semua sampel digiling menggunakan alat *hummer meal* dengan *screen* 1 mm<sup>2</sup>, tepung daun dan batang kayu selanjutnya dianalisis kandungan nutrisi dan pencernaan secara *in vitro* di Laboratorium Biokimia Nutrisi, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada.

**In vitro produksi gas.** Sampel diinkubasi *in vitro* berdasarkan metode Menke et al. (1988) yang dimodifikasi oleh Blümmel et al. (1997). Sebanyak 300 mg sampel diinkubasikan ke dalam medium berupa cairan rumen-buffer. Cairan rumen diambil pada pagi hari dari sapi friesian holstein berfi stula sebelum diberi pakan. Setelah koleksi, cairan rumen dibawa ke laboratorium, disaring dengan saringan nilon berukuran 100 µm, dan ditambah buffer tereduksi. Rumen-buffer dijenuhkan dengan gas CO<sub>2</sub> selama 10 menit sebelum dimasukkan ke dalam tabung syringe untuk menjamin kondisi anaerob dalam reaksi. Sampel dimasukkan ke dalam tabung dan ditutup dengan piston yang telah dilubrikasi oleh vaselin. Sebanyak 30 ml cairan rumen-buffer dimasukkan ke dalam masing-masing tabung melalui saluran inlet, kemudian tabung segera dimasukkan ke dalam water bath bersuhu 39 °C. Produksi gas diamati pada jam ke-0, 3, 6, 12, 48 setelah dilakukan inkubasi, selanjutnya sample hasil inkubasi disaring dan dianalisis bahan kering dan bahan organik untuk diamati pencernaan bahan kering dan bahan organik.

**Peubah yang diamati.** Peubah yang diamati meliputi data produksi segar pada bagian tanaman kaliandra dan gamal, diameter dan panjang ranting tanaman kaliandra, analisis proksimat (AOAC, 1990), Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Bahan Organik (KcBO). Data yang diperoleh dilakukan pengujian independent sample *t-test*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Produksi daun dan kulit batang kayu selama pemanenan

Hasil panen untuk setiap 56 hari dipisahkan antara daun dan batang yang besarnya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa produksi segar (Kg/pohon) kaliandra dan gamal pada bagian yang berbeda tidak memiliki perbedaan yang tidak nyata  $P > 0,05$ . Selanjutnya dari hasil pengamatan juga diketahui bahwa diameter cabang tanaman kaliandra lebih kecil dibandingkan gamal ( $P < 0,05$ ), akan tetapi panjang cabang dari kedua tanaman ini tidak berbeda nyata ( $P > 0,05$ ).

**Tabel 1.** Produksi segar kaliandra dan gamal pada bagian tanaman yang berbeda

Produksi Segar	Jenis tanaman	
	Kaliandra	Gamal
Daun (kg/56 hari)	0,62 <sup>ns</sup>	0,50
Batang (kg/56 hari)	0,49 <sup>ns</sup>	0,35
Kulit (Kg)	0,19 <sup>ns</sup>	0,09
Batang tanpa kulit (Kg)	0,28 <sup>ns</sup>	0,24
Daun dan batang (Kg)	1,08 <sup>ns</sup>	0,90
Diameter cabang (mm)	45,14 <sup>a</sup>	63,10 <sup>b</sup>
Panjang cabang (cm)	717,26 <sup>ns</sup>	744,18

<sup>ns</sup>): Superskrip yang tidak berbeda menunjukkan pengaruh yang tidak nyata ( $P > 0,05$ )

(<sup>a-b</sup>): Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh yang nyata ( $P < 0,05$ )

Hasil pengamatan produksi segar baik kaliandra dan gamal tidak berbeda nyata untuk penanaman pada areal pematang sawah. Diameter cabang gamal memiliki diameter cabang yang lebih besar dibandingkan diameter cabang gamal. Menurut Mustofa (2009) Batang gamal berukuran kecil hingga sedang, tingginya dapat mencapai 10-12m, sering bercabang dari dasar dengan diameter basal mencapai 50-70 cm. Kulit batang halus dengan warna bervariasi, dari putih abu-abu kemerah tua-coklat. Sedangkan untuk kaliandra menurut Kartikasari (2001) adalah pohon kecil bercabang yang tumbuh mencapai tinggi maksimum 12 m dan diameter batang maksimum 20 cm. Kulit batangnya berwarna merah atau abu-abu yang tertutup oleh lentisel kecil, pucat berbentuk oval. Ke arah pucuk batang cenderung bergerigi, dan pada pohon yang batangnya coklat-kemerahan, ujung batangnya bisa berulas merah.

Menurut Kartikasari (2001) *Calliandra calothyrsus* dapat ditanam dalam satu atau beberapa barisan di sepanjang batas lahan petani atau pada tanggul kontur, guludan teras atau tempat-tempat yang serupa. Di banyak tempat, lokasi seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menanam kaliandra tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman pangan didekatnya. Dalam barisan, pohon ditanam dengan jarak 40-50 cm. Hasilnya akan beragam bergantung pada iklim, kesuburan tanah, dan faktor-faktor lainnya. Di salah satu lokasi penanaman di sub-Sahara Afrika, pohon yang umurnya lebih dari dua tahun menghasilkan hijauan yang dapat dimakan sebanyak 3-5 kg bahan kering per meter barisan per tahun (Paterson et al., 1996). Sedangkan tanaman gamal mempunyai produksi daun yang cukup melimpah selama musim penghujan. Lidjang et al ; (1992) memperoleh bahwa tanaman gamal yang berumur hampir 3 tahun, yang ditanam sebagai *hedge row* pada pertanaman lorong dapat memberikan produksi hijauan sampai 30 ton per ha.

Hasil data produksi daun dan batang pada tanaman kaliandra dan gamal pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa proporsi daun : batang pada rasio 57%: 45%. Ella et al (1991) menyatakan bahwa peningkatan umur tanaman diikuti dengan peningkatan pada produksi dan proporsi ranting, serta penurunan proporsi daunnya. Penurunan pada proporsi daun dan ranting akan berhubungan dengan peningkatan kandungan dinding sel (Djuned et al., 2005), selanjutnya Mei et al (2015) menjelaskan bahwa setiap peningkatan umur pemotongan juga disertai dengan peningkatan produksi daun, ranting dan total tanaman. Kedua tanaman kaliandra dalam penelitian ini memiliki umur tanamn selama lima

tahun dengan masa pemanenan setiap 56-60 hari, sehingga proporsi daun dan batang dari kedua tanaman ini berkisar 50-60%.

### Kualitas Nutrisi Kaliandra dan Gamal dari Bagian Tanaman yang Berbeda

Tanaman pakan ternak yang dipanen pada umur pematangan yang lama akan mempengaruhi kualitas dari hijauan, selain produktivitas tanaman, kualitas hijauan juga ditentukan dari kandungan nutrisi tanaman, beberapa diantaranya adalah kandungan bahan kering (BK), bahan organik (BO), serat kasar (SK) dan protein kasar (PK). Kandungan nutrisi dan nilai pencernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik (KcBO) disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2. Nilai pencernaan daun gamal dan kaliandra hampir sama yakni 45%, akan tetapi pada bagian kulit kayu baik kaliandra dan gamal memiliki nilai pencernaan yang tinggi antara 59-60%. Perbedaan nilai pencernaan pada bagian daun dan kulit kayu juga dipengaruhi dari komposisi nutrisi yang lain pada bagian tanaman tersebut, misalnya kandungan protein dan serat. Menurut Firsoni dan Ansori (2015) daun gamal memiliki protein kasar 23,5%, lemak kasar 3,1% serat kasar 16,77%, Ca 1,3%, dan P 0,18%, sedangkan daun kaliandra memiliki protein kasar 29,28%, lemak kasar 5,55%, dan serat kasar 9,44% (Novia et al., 2015).

**Tabel 2.** Kecernaan bahan kering dan bahan organik pada bagian tanaman kaliandra dan gamal\*

Parameter pengamatan	Bagian tanaman			
	Daun		Kulit Kayu	
	Kaliandra	Gamal	Kaliandra	Gamal
Bahan Kering (% BK)	89,52	90,26	91,42	90,17
Bahan Organik (% BO)	94,08	90,68	92,7	90,97
Protein Kasar (% PK)	16,01	24,68	16,76	15,84
Lemak Kasar (% LK)	7,43	15,78	9,4	8,88
Serat Kasar (% SK)	29,58	15,70	24,05	33,07
Kecernaan bahan kering (%KcBK)	32,81	37,99	51,25	54,61
Kecernaan bahan organik (%KcBO)	45,19	45,16	60,48	59,49

\*Hasil analisis Laboratorium Biokimia Nutrisi, Fakultas Peternakan, UGM

Kecernaan bahan kering merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas ransum. Semakin tinggi pencernaan bahan kering maka semakin tinggi pula peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk pertumbuhannya (Afriyanti, 2008). Sedangkan pencernaan bahan organik menggambarkan ketersediaan nutrient dari pakan. Kecernaan bahan organik dalam saluran pencernaan ternak meliputi pencernaan zat-zat makanan berupa komponen bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Bahan-bahan organik yang terdapat dalam pakan tersedia dalam bentuk tidak larut, oleh karena itu diperlukan adanya proses pemecahan zat-zat tersebut menjadi zat-zat yang mudah larut. Hasil evaluasi pencernaan bahan kering dan bahan organik pada Tabel 2 bahwa rata-rata kandungan BK dan BO dari semua bagian morfologi tanaman kaliandra dan gamal hampir sama pada kisaran 80-90%, untuk kandungan PK tertinggi pada daun gamal sebanyak 24,68% dan pada bagian kulit kayu sebanyak 15,84%.

Rataan pencernaan bahan organik pada penelitian hampir sama diduga karena pencernaan bahan kering pada penelitian ini juga menunjukkan pencernaan bahan kering yang hampir sama pada semua bagian tanaman. Sesuai dengan pendapat Sutardi (1980), degradasi bahan organik erat kaitannya dengan degradasi bahan kering, karena sebagian bahan kering terdiri dari bahan organik. Darwis (1988) menyatakan bahwa penurunan pencernaan bahan kering mengakibatkan pencernaan bahan organik menurun atau sebaliknya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Crampton dan Harris (1969) bahwa pencernaan makanan tergantung pada aktifitas mikroorganisme rumen karena mikroorganisme rumen berperan dalam proses fermentasi, sedangkan aktifitas mikroorganisme rumen itu sendiri dipengaruhi oleh zat-zat makanan yang terdapat dalam bahan makanan.

Kecernaan bahan kering dan bahan organik pada bagian kulit lebih tinggi dibandingkan nilai pencernaan pada bagian daun dikarenakan bagian kayu yang dipanen memiliki diameter 45-60 mm dan

pada bagian batang yang muda, selanjutnya dikelupas pada bagian kulitnya saja. Kartikasari (2001) juga menjelaskan bahwa dengan sistem pangkas dan angkut, pohon kaliandra dibiarkan tumbuh sampai ketinggian tertentu kemudian dipangkas. Kemudian tunas baru dipangkas secara berkala dan diberikan kepada ternak yang berada di tempat lain. Ketika hijauan ternak sangat banyak dan tumbuh sangat cepat, ternak akan memakan cabang-cabang yang hijau dan lunak yang diameternya mencapai sekitar 1 cm. Namun ketika tanaman tumbuh lebih lambat, cabang menjadi berkayu dan diameternya lebih kecil, dan ternak hanya akan memakan cabang-cabang yang diameternya lebih kecil dari 0,4 cm. Setelah ternak memakan daun dan ranting kecil (bagian yang bisa dimakan), sisa batangnya dapat dikeringkan dan digunakan sebagai kayu bakar. Untuk mengoptimalkan nilai gizi hijauan ternak, pemangkasan sebaiknya dilakukan jika tunas baru sudah mencapai ketinggian sekitar 100 cm. Saat itu, bagian yang dapat dimakan mencapai 50-60 % dari biomassa total. Umumnya cara pemangkasan seperti ini dapat dilakukan empat sampai enam kali setahun. Selama musim hujan, kaliandra dapat dipangkas setiap enam minggu sekali tanpa mengalami penurunan produktivitas dan kualitas.

Penggunaan legume sebagai pakan tunggal pada ternak ruminansia, perlu adanya suatu penelitian, mengingat ada beberapa kendala penggunaan legume sebagai pakan ternak. Kendala penggunaan Kaliandra sebagai pakan tunggal adalah ketersediaan nutrisi menjadi rendah karena Kaliandra mengandung tannin yang dapat melindungi protein dari proses perombakan oleh mikroba rumen dan proses enzimatik dalam usus, sehingga dapat menurunkan pemanfaatan nutrisi oleh ternak. Tangendjaja et al. (1992) melaporkan bahwa kandungan tanin dalam Kaliandra sebesar 1,5 hingga 11,3 persen dan memiliki daya cerna bahan kering secara *in vitro* berkisar antara 35 hingga 53 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tanaman leguminosa lainnya, seperti Lamtoro, Gamal, dan Sengon. Hasil penelitian Tangendjaja ini mendukung hasil penelitian yang menunjukkan pencernaan baik kaliandra dan gamal sebagai pakan tunggal pada ternak ruminansia berkisar antara 45-60%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencernaan kedua bahan pakan tersebut tidak terlalu tinggi, akan tetapi menurut ARC (1984) besarnya pencernaan pakan pada ternak ruminansia sekitar 65% tergantung dari mikroba rumen. Pencernaan juga sangat tergantung pada komposisi zat makanan yang terkandung dalam pakan dan laju aliran pakan meninggalkan rumen (Ørskov dan Ryle 1990). Hasil pencernaan bahan organik sejalan dengan pencernaan bahan kering, hal ini karena kadar bahan organik terdapat dalam bahan kering sehingga hasil pencernaan bahan organik sejalan dengan pencernaan bahan kering (Trisnadewi dan Cakra, 2015).

## KESIMPULAN

Evaluasi kualitas nutrisi dan pencernaan pada bagian morfologi tanaman kaliandran dan gamal dapat disimpulkan bahwa bagian kulit kayu lebih tinggi dibandingkan bagian daun, sedangkan untuk produksi tanaman tidak berbeda nyata antara kedua tanaman tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, M., 2008. Fermentabilitas dan pencernaan *in vitro* ransum yang diberi kursin bungkil biji jarak pagar (*Jatropha curcas L.*) pada ternak sapi dan kerbau. Skripsi Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Andrew, S. 1994. Tropical Feeds and Feeding Systems. First FAO electronic conference on tropical feeds and feeding systems. Diakses pada tanggal 4 Februari 2017.
- ARC. 1984. *The Nutrient Requirement Of Ruminant Livestock*. England (UK): Commonwealth agricultural Bureaux, Slough. at two cutting heights an interval. Livestock Research Centre. Malaysia. Cetakan III. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Crampton, E. E. and Harris L. E., 1969. Applied Animal Nutrition 2<sup>nd</sup> Edition. L. H. Freeman and Co, San Francisco.
- Djuned, H., Mansyur, dan Wijayanti H. B., 2005. Pengaruh umur pemotongan terhadap kandungan fraksi serat hijauan murbei (*Morus indica* L. Var. Kanva-2). Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.
- Elevitch, C.R and Francis, J.K. 2006. Species profiles for island agroforestry. [www.traditionaltree.org](http://www.traditionaltree.org). Diakses pada tanggal 4 Februari 2017.
- Firsoni dan Ansori D., 2015. Manfaat Urea Molasses Multinutrien Blok (UMMB) yang Mengandung Tepung Daun *Gliricidia sepium* secara In-vitro. Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi A Scientific Journal for The Applications of Isotopes and Radiation Vol. 11 No. 2 Desember 2015.
- Gardner, F.P., Pearce B., dan Mitchell R. L., 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Terjemahan : Susilo Herawati. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hartadi, H., Reksohadiprodjo S. and Tillman A.D., 1993. Tabel komposisi pakan untuk indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Karda, I W., 2011. Kaliandra Merah Dalam Sistem Pertanian Konservai peluang, Kendala dan Solusi. Udayana University Press.
- Kartikasari, SN. 2001. Produksi dan Pemanfaatan Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*). Pedoman Lapangan. Winrock International dan the Taiwan Forestry Research Institute. Berkolaborasi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Department Kehutanan, Indonesia, the Overseas Development
- McDonald, P., Edwards R. A., dan Greenhalgh J. F. D., 1988. Animal Nutrition. 4th Edition. New York : Longman Scientific & Technical.
- Mei, V.S., Sudarwati H., Hermanto, 2015. Pengaruh Umur Pemotongan Terhadap Produktivitas Gamal (*Gliricidia sepium*). Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan 23 (2):25-35. ISSN: 0852-3581.
- Menke K.H., Steingass H., 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and *in vitro* gas production using rumen fluid. Anim. Res. Develop. 28, 499–503.
- Mulyana, A., Sumarta, T. Hidayat, dan Karma. 2006. Produktivitas Beberapa Varietas Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) sebagai Hijauan Pakan Ternak. Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- Mustofa. 2009. Informasi Spesies Gamal (*Gliricidia sepium*) (<http://www.plantamor.com>) tanggal akses 4 juli 2009.
- Natalia, H., Nista D., dan Hindrawati S., 2009. Keunggulan gamal sebagai pakan ternak. <http://bptusembawa.net/v1/data/download/20110928094232.pdf>. Diakses tanggal 4 Februari 2017.

- Novia, Q, Y, Retnani., dan Permana I.G.,. 2015. Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik Wafer Daun Kaliandra Pada Kambing Peranaan Etawah. *Agros Vol.17 No.1, Januari 2015: 113-120. ISSN 1411-0172.*
- Ørskov E.R., 2000. New concepts of feed evaluation for ruminants with emphasis on roughages and feed intake. *Asian–Austr. J. Anim. Sci.* 13, 128-136.
- Ørskov E.R., Ryle M., 1990. *Energy Nutrition in Ruminants.* Elsevier Applied Science, London (UK), pp. 133-144
- Salawu, M.B., Acamovic T., Stewart C.S., Roothaert R.L., 1999. Composition and degradability of different fractions of Calliandra leaves, pods, and seed. *Animal Feed Science and Technology* 77. 181-199.
- Sitompul, S. M. dan Guritno B., 1995. *Analisis Pertumbuhan Tanaman.* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutardi T. 1980. *Landasan Ilmu Nutrisi Jilid 1.* Bogor (ID) Institut Pertanian Bogor.
- Tangendjaja, B., Wina E., Palmer B. dan Ibrahim T. (penyunting), 1992. *Kaliandra dan pemanfaatannya.* ACIAR dan Balitnak.
- Trisnadewi, A.A.A.S dan Cakra I.G.L.O., 2015. Kecernaan in vitro Tanaman Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) Berbunga Merah dan Putih. *Pastura Vol.5.No.1:39-41. ISSN:2088—818x.*
- Wong, C. C. 2012. Assessment of *Gliricidia sepium* provenance Retalhuleu for forage production at two cutting heights an interval. *Livestock Research Center.* Malaysia.